

SUTAB®

(كبريتات الصوديوم وكبريتات
المغنيسيوم وكلوريد البوتاسيوم)
أقراص
1.479 جم/0.225 جم/0.188 جم



معلومات خاصة بمقدم الرعاية الصحية

الاسم: _____
العنوان: _____
المدينة: _____
الولاية: _____
الرمز البريدي: _____
الهاتف: _____
الفاكس: _____

نظام الجرعات

يتكون نظام SUTAB العلاجي من جرعة مُقسَّمة (على يومين). يلزم تناول ما مجموعه 24 قرصًا للتحضير التام لتنظير القولون. ينبغي تناول الأقراص في جرعتين كل منهما 12 قرصًا. يجب شرب الماء مع كل جرعة من جرعتي SUTAB، وشرب كمية إضافية من الماء بعد كل جرعة.

نوصيك بالحفاظ على ترطيبك
SUTAB قبل وأثناء وبعد تناول.

اليوم الأول، الجرعة الأولى - في المساء قبل تنظير القولون:

ابتلع 12 قرصًا مع أول 16 أونصة من الماء

في اليوم السابق لتنظير القولون، افتح الزجاجة الأولى التي تحتوي على 12 قرصًا وتناول SUTAB على النحو الموضح بالأسفل.

الخطوة الأولى افتح زجاجة واحدة محتوية على 12 قرصًا. **أزل المادة المُجفَّفة وتخلص منها.** **أخرج المادة المُجفَّفة** من الزجاجة الثانية وأغلقها. استخدم الزجاجة الثانية للجرعة الثانية في صباح يوم تنظير القولون.

الخطوة الثانية املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية).

ابتلع قرصًا واحدًا كل دقيقة أو دقيقتين. يجب الانتهاء من تناول 12 قرصًا و 16 أونصة كاملة من الماء في غضون 20 دقيقة.

تنبيه مهم: إذا شعرت بأعراض لها علاقة بالتحضير (مثل، الغثيان، الانتفاخ، التقلصات)، توقف أو تمهل في معدل شرب الكمية الإضافية من الماء حتى تتلاشى الأعراض.

اشرب 16 أونصة إضافية من الماء

الخطوة الثالثة بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص الأخير، املاً الحاوية المرفقة مرة أخرى بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، واشرب الكمية بأكملها على مدى 30 دقيقة.

الخطوة الرابعة بعد 30 دقيقة تقريبًا من الانتهاء من شرب محتوى حاوية الماء الثانية، املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، واشرب الكمية بأكملها على مدى 30 دقيقة.

اليوم الثاني، الجرعة الثانية - صباح يوم تنظير القولون (5 إلى 8 ساعات قبل تنظير القولون، ولكن ليس قبل أقل من 4 ساعات من بدء تناول الجرعة الأولى)

ابتلع الأقراص المتبقية التي يبلغ عددها 12 قرصًا مع 16 أونصة من الماء



لا تظهر الأقراص بالحجم الفعلي.

• استمر في شرب السوائل الشفافة فقط حتى بعد الانتهاء من التنظير.

• كرر الخطوات من اثنين إلى أربعة من اليوم الأول، الجرعة الأولى.

• إذا شعرت بأعراض لها علاقة بالتحضير (مثل، الغثيان، الانتفاخ، التقلصات)، توقف أو تمهل في معدل شرب الكمية الإضافية من الماء حتى تتلاشى الأعراض.

• انته من تناول كافة أقراص SUTAB والماء قبل ساعتين على الأقل من إجراء تنظير القولون.

(يُرجى الاطلاع على الصفحة الأخرى لمزيد من الإرشادات الإضافية.)

