

为您进行检查的医生: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

检查日期: \_\_\_\_\_ 抵达时间: \_\_\_\_\_ 上午/下午

备注: \_\_\_\_\_

# SUTAB®

(硫酸钠、硫酸镁  
和氯化钾)  
药片

1.479 g/0.225 g/0.188 g



## 在结肠镜检查 前一日

### 您可以做哪些事

- 您可以食用低渣早餐。低渣食物包括鸡蛋、白面包、干酪、酸奶、粗玉米粉、咖啡和茶。
- 您可以饮用澄清液体。

### 您不可以做哪些事

- 切勿饮用牛奶，切勿食用或饮用任何红色或紫色的食物或饮品。
- 切勿饮酒。
- 服用 SUTAB 时切勿服用其他泻药。
- 在每次开始服用 SUTAB 前的 1 小时内切勿服用口服药物。
- 如果服用四环素 (tetracycline) 或氟喹诺酮类抗生素 (fluoroquinolone antibiotics)、铁 (iron)、地高辛 (digoxin)、氯丙嗪 (chlorpromazine) 或青霉胺 (penicillamine)，则应在每次服用 SUTAB 的至少 2 小时前和不少于 6 小时后服用上述药物。

### 可以饮用的液体

- 咖啡或茶 (不含奶油或非乳制奶精)
- 果汁 (不含果肉)
- 明胶甜点 (不含水果或打顶奶油)
- 水
- 鸡汤
- 澄清苏打水 (如姜汁汽水)

#### 注释

- SUTAB 是一种渗透性泻药，可用于清洁结肠，为成人结肠镜检查做好准备。
- 请务必告知您的医生您所服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。SUTAB 可能会影响其他药物的药效。
- 如果在开始服用每剂 SUTAB 前 1 小时内口服其他药物，药物可能无法正常吸收。
- 服用 SUTAB 后最常见的不良反应是恶心、腹胀、呕吐和上腹痛。
- 如果服用 SUTAB 后出现明显的呕吐或脱水体征，或者出现心律不齐或癫痫发作，请与您的医务人员联系。
- 如果您对服用 SUTAB 有任何疑问，请致电您的医生。

## 给药方案

SUTAB 为分剂量 (2 天) 给药方案。为了完成结肠镜检查的准备，共需要服用 24 片药片。您将分两次服药，每次服用 12 片药片。每次服用 SUTAB 时必须饮水，并且在服用每次剂量后都必须饮用额外的水。

### 第 1 剂 — 结肠镜检查前一天

#### 用水送服药片

**第 1 步** 打开一个含 12 片药片的药瓶。

**第 2 步** 在提供的容器中装满 16 盎司的水 (至填充线)。用少量水吞咽每片药片，并在 15 至 20 分钟内喝掉全部水。



并未以实际大小显示药片。

**重要事项:** 如果您发生与准备检查有关的症状 (如恶心、腹胀或抽筋)，请暂停饮用额外的水或减慢饮水速度，直到症状减轻为止。

#### 饮用额外的水

**第 3 步** 服用最后一片药片约 1 小时后，再次将提供的容器装满 16 盎司的水 (至填充线)，并在 30 分钟内饮用完毕。

**第 4 步** 在喝完第二个容器中的水后约 30 分钟，将提供的容器装满 16 盎司的水 (至填充线)，并在 30 分钟内喝掉全部的水。

### 第 2 剂 — 结肠镜检查当天

- 在完成结肠镜检查前，仅可继续饮用澄清液体。
- 在结肠镜检查日的早晨 (结肠镜检查前 5 至 8 个小时并且在开始服用第 1 剂药物 4 小时后)，打开第二瓶含 12 片药片的药瓶。
- 重复第 1 剂药物的步骤 1 到步骤 4。



并未以实际大小显示药片。

**重要事项:** 您必须在结肠镜检查前至少 2 小时服用完所有的 SUTAB 药片和所需的水。

请阅读药盒中的完整处方信息和药物指南。

作为来自下列机构的教育服务而提供

Braintree  
SEBELA PHARMACEUTICALS 的子公司

©2021 Braintree Laboratories, Inc.

201-189-v1

2021 年 1 月

欲了解有关此产品的更多信息，请致电 1-800-874-6756。