

O seu procedimento será realizado pelo(a) Doutor(a): \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Data do procedimento: \_\_\_\_\_ Chegar às: \_\_\_\_\_ manhã/tarde

Observações: \_\_\_\_\_

# SUTAB®

(sulfato de sódio, sulfato de magnésio e cloreto de potássio)

Comprimidos

1,479 g/0,225 g/0,188 g



## No dia anterior ao procedimento

### O que você **PODE** fazer

- Você pode tomar um café da manhã com poucos resíduos. Alimentos com poucos resíduos incluem ovos, pão branco, queijo cottage, iogurte, grits, café e chá.
- Você pode beber líquidos transparentes.

### O que você **NÃO PODE** fazer

- Não beba leite e nem beba ou coma nada que tenha cor vermelha ou roxa.
- Não tome bebidas alcoólicas.
- Não tome outros laxantes enquanto estiver tomando SUTAB.
- Não tome medicamentos orais menos de 1 hora antes do início de cada dose de SUTAB.
- Caso esteja tomando tetraciclina ou antibióticos de fluoroquinolona, ferro, digoxina, clorpromazina ou penicilamina, tome esses medicamentos pelo menos 2 horas antes e no mínimo 6 horas depois da administração de cada dose de SUTAB.

### Líquidos que **PODEM** ser ingeridos

- Café ou chá (sem leite nem creme não lácteo)
- Suco de frutas (sem polpa)
- Gelatina (sem frutas ou outras coberturas)
- Água
- Caldo de galinha
- Refrigerantes transparentes (como ginger ale)

### Observação

- SUTAB é um laxante osmótico indicado para a limpeza do cólon como parte do preparo para a colonoscopia em adultos.
- Certifique-se de informar ao seu médico todos os medicamentos que você usa, o que inclui medicamentos (receitados ou não), vitaminas e fitoterápicos. SUTAB pode afetar o modo como outros medicamentos funcionam.
- Medicamentos tomados por via oral podem não ser absorvidos adequadamente quando ingeridos menos de 1 hora antes do início de cada dose de SUTAB.
- As reações adversas mais comuns após a administração de SUTAB são náusea, distensão abdominal, vômito e dor na parte superior do abdome.
- Entre em contato com o seu prestador de serviços de saúde caso comece a vomitar de maneira intensa ou desenvolva sinais de desidratação após o uso de SUTAB, ou se apresentar arritmias cardíacas ou convulsões.
- Em caso dúvidas sobre o uso do SUTAB, ligue para o seu médico.

Para saber mais sobre este produto, ligue para +1-800-874-6756.

## Esquema posológico

SUTAB deve ser administrado em um esquema de dose dividida (2 dias). No total, devem ser tomados 24 comprimidos para completar o preparo para a colonoscopia. Você deverá tomar os comprimidos em duas doses de 12 comprimidos cada. É necessário tomar cada dose de SUTAB com água e beber mais água depois de cada dose.

### DOSE 1—No dia anterior à colonoscopia

#### Tome os comprimidos com água

**ETAPA 1** Abra um frasco de 12 comprimidos.

**ETAPA 2** Preencha o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente). Engula cada comprimido com um gole de água e beba toda a água restante em 15 a 20 minutos.



Os comprimidos não são mostrados em tamanho real.

**IMPORTANTE:** Caso você apresente sintomas relacionados ao preparo (náusea, distensão abdominal ou cólicas, por exemplo), faça uma pausa ou reduza o ritmo de consumo da água adicional até a diminuição dos sintomas.

#### Beba mais água

**ETAPA 3** Cerca de 1 hora após a ingestão do último comprimido, preencha novamente o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente), e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

**ETAPA 4** Cerca de 30 minutos após beber o segundo recipiente com água, preencha novamente o recipiente com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente), e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

### DOSE 2—No dia da colonoscopia

- Continue a ingerir apenas líquidos transparentes até o término da colonoscopia.
- Na manhã do dia da colonoscopia (5 a 8 horas antes da colonoscopia e não menos de 4 horas após o início da Dose 1), abra o segundo frasco de 12 comprimidos.
- Repita as ETAPAS 1 a 4 da Dose 1.



Os comprimidos não são mostrados em tamanho real.

**IMPORTANTE:** Você deve terminar de tomar todos os comprimidos de SUTAB e o volume indicado de água até 2 horas antes da colonoscopia.

Leia a bula completa e o Guia de Medicação contidos no kit.

Fornecido como serviço educacional por Braintree

A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS\*