

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Наименование: _____

Адрес: _____

Город: _____

Штат: _____ ИНДЕКС: _____

Телефон: _____ Факс: _____

SUTAB[®]

(сульфат натрия, сульфат магния и хлорид калия)
таблетки

1,479 г/0,225 г/0,188 г

Режим дозирования

Препарат SUTAB принимается в течение двух дней. В общей сложности для полной подготовки к колоноскопии требуется 24 таблетки. Вам нужно будет принять две дозы, по 12 таблеток каждая. Каждую дозу препарата SUTAB надо обязательно запивать водой. После каждой дозы обязательно следует выпить дополнительное количество воды.



ДОЗА 1: в день перед колоноскопией

Примите таблетки, запивая их водой.

ШАГ 1. Откройте 1 флакон с 12 таблетками.

ШАГ 2. Налейте в стаканчик, поставляемый вместе с таблетками,

16 унций (470 мл) воды (до риски). Принимая

каждую таблетку, запивайте ее глотком воды, всю воду нужно выпить за 15–20 минут.



Размер таблеток, представленных на рисунке, отличается от реального.



ВАЖНО! Если у вас появились симптомы, связанные с подготовкой к исследованию (например, тошнота, вздутие живота или спазмы), сделайте небольшую паузу или пейте дополнительное количество воды медленнее, пока симптомы не ослабнут.

Выпейте дополнительное количество воды.

ШАГ 3. Приблизительно через 1 час после приема последней таблетки снова наполните стаканчик, поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (470 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в течение 30 минут.

ШАГ 4. Приблизительно через 30 минут после того как будет выпит второй стаканчик воды, наполните стаканчик, поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (470 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в течение 30 минут.

ДОЗА 2: в день проведения колоноскопии

- До завершения колоноскопии употребляйте только прозрачные жидкости.
- Утром в день колоноскопии (от 5 до 8 часов до колоноскопии и не раньше чем через 4 часа после начала приема дозы 1) откройте второй флакон с 12 таблетками.
- Повторите ШАГИ 1–4, перечисленные для приема дозы 1.



Размер таблеток, представленных на рисунке, отличается от реального.



ВАЖНО! Вы должны принять все таблетки SUTAB и выпить все необходимое количество воды не менее чем за 2 часа до колоноскопии.

(См. дополнительные указания на следующей странице.)

