

Badanie będzie wykonane przez: _____

Adres: _____

Data badania: _____ Godzina zgłoszenia się na badanie: _____ AM/PM

Uwagi: _____

SUTAB[®]
(siarczan sodu, siarczan
magnezu lub chlorek potasu)
Tabletki
1,479 g/0,225 g/0,188 g



W dniu poprzedzającym badanie

Co JEST dozwolone

- Można zjeść śniadanie składające się z ubogoreszkowych produktów żywnościowych. Ubogoreszkowe produkty żywnościowe obejmują jajka, biały chleb, twaróg, jogurt, płatki owsiane, kawę i herbatę.
- Można przyjmować klarowne płyny.

Co NIE JEST dozwolone

- Nie wolno pić mleka oraz jeść ani pić niczego o czerwonym lub purpurowym zabarwieniu.
- Nie wolno pić alkoholu.
- Podczas przyjmowania SUTAB nie wolno przyjmować innych środków przeczyszczających.
- Nie wolno przyjmować doustnych leków w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania każdej dawki SUTAB.
- W przypadku stosowania antybiotyków tetracyklinowych lub fluorochinolonowych, żelaza, digoksyny, chlorpromazyny lub penicylaminy należy je przyjąć na co najmniej 2 godziny przed przyjęciem i nie wcześniej niż po upływie co najmniej 6 godzin od przyjęcia każdej dawki SUTAB.

DOZWOLONE płyny

- Kawa lub herbata (bez śmietanki lub bezmlecznego zabielaacza)
- Soki owocowe (bez miąższu)
- Desery galaretkowe (bez owoców lub przybrania)
- Woda
- Bulion z kurczaka
- Klarowne napoje gazowane (np. gazowany napój z imbirem)

Uwaga

- SUTAB to osmotyczny środek przeczyszczający wskazany do oczyszczania jelita grubego u osób dorosłych w ramach przygotowania do kolonoskopii.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach, w tym wydawanych na receptę i bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych. SUTAB może wpływać na działanie innych leków.
- Leki przyjmowane doustnie mogą nie zostać prawidłowo wchłonięte, jeśli będą przyjęte w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania każdej dawki SUTAB.
- Najczęstsze działania niepożądane po podaniu SUTAB obejmowały nudności, wzdęcia, wymioty i ból w nadbrzuszu.
- W przypadku wystąpienia ciężkich wymiotów lub oznak odwodnienia po przyjęciu SUTAB, lub w przypadku wystąpienia arytmii serca lub napadów drgawkowych należy skontaktować się z dostawcą usług medycznych.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SUTAB należy zadzwonić do swojego lekarza.

Informacje o tym produkcie można uzyskać dzwoniąc pod numer 1-800-874-6756.

Dawkowanie


SUTAB podawany jest w dawkach podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Do pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są łącznie 24 tabletki. Tabletki będą przyjmowane w dwóch dawkach, z których każda składa się z 12 tabletek. Każdą dawkę SUTAB należy przyjmować popijając wodą oraz konieczne będzie wypicie dodatkowej ilości wody po przyjęciu każdej dawki.

DAWKA 1—w dniu poprzedzającym kolonoskopię

Przyjmij tabletki popijając wodą

KROK 1 Otwórz jedną butelkę zawierającą 12 tabletek.

KROK 2 Napełnij dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia). Połknij każdą tabletkę popijając wodą i wypij całą ilość wody w ciągu 15 do 20 minut.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

WAŻNE: W przypadku wystąpienia objawów związanych z przygotowaniem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zwolnić prędkość przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.

Wypij dodatkową ilość wody

KROK 3 Po upływie około 1 godziny od momentu połknięcia ostatniej tabletki należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

KROK 4 Po upływie około 30 minut od opróżnienia drugiego pojemnika należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

DAWKA 2—w dniu kolonoskopii

- Do czasu wykonania kolonoskopii należy kontynuować przyjmowanie wyłącznie klarownych płynów.
- Rano w dniu kolonoskopii (5 do 8 godzin przed kolonoskopią, lecz nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki 1) należy otworzyć drugą butelkę zawierającą 12 tabletek.
- Powtórz KROK 1 do KROKU 4 z dawki 1.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

WAŻNE: Wszystkie tabletki SUTAB należy przyjąć oraz wypić całość wymaganej ilości wody co najmniej na 2 godziny przed kolonoskopią.

Należy zapoznać się z całością treści druków informacyjnych oraz instrukcji stosowania leku, które załączono do zestawu.

Dostarczone w ramach usług edukacyjnych przez

Braintree
CZĘŚĆ SERBIA PHARMACEUTICALS[®]

©2021 Braintree Laboratories, Inc.

201-191-v1

Styczeń 2021