

معلومات خاصة بمقدم الرعاية الصحية

SUTAB®

كبريتات الصوديوم وكبريتات المغنيسيوم
وكلوريد البوتاسيوم)
أقراص
1.479 جم/0.225 جم/0.188 جم



نظام الجرعات

SUTAB هو جرعة مقسمة (على يومين). يلزم تناول ما مجموعه 24 قرصًا للتخصير التام لتنظيف القولون. ينبغي تناول الأقراص في جرعتين بمقدار 12 قرصًا في كل جرعة. يجب شرب الماء مع كل جرعة SUTAB، وشرب كمية إضافية من الماء بعد كل جرعة.

نوصيك بالحفاظ على ترطيبك قبل وأثناء وبعد تناول SUTAB.

اليوم الأول، الجرعة الأولى اليوم السابق لخضوعك لتنظيف القولون

ابتلع 12 قرصًا مع أول أونصة من الماء

في اليوم السابق لتنظيف القولون، افتح الزجاجة الأولى التي تحتوي على 12 قرصًا وتناول SUTAB على النحو الموضح بالأسفل.
الخطوة الأولى افتح زجاجة واحدة محتوية على 12 قرصًا.

الخطوة الثانية املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية).
ابتلع قرصًا واحدًا كل دقيقة أو دقيقتين. يجب الانتهاء من تناول 12 قرصًا مع 16 أونصة كاملة من الماء في غضون 20 دقيقة.



لا تظهر الأقراص بالحجم الفعلي.

إذا شعرت بأعراض لها علاقة بالتخصير (مثل، الغثيان، الانتفاخ، التقلصات)، توقف أو تمهل في معدل شرب الكمية الإضافية من الماء حتى تتلاشى الأعراض.

اشرب 16 أونصة إضافية من الماء

الخطوة الثالثة بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص الأخير، املاً الحاوية المرفقة مرة أخرى بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، ثم اشرب الكمية بالكامل خلال 30 دقيقة.
الخطوة الرابعة بعد 30 دقيقة تقريبًا من شرب ماء الحاوية بالكامل للمرة الثانية، املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، ثم اشرب الكمية بالكامل خلال 30 دقيقة.

اليوم الثاني، الجرعة الثانية يوم خضوعك لتنظيف القولون

ابتلع الأقراص المتبقية التي يبلغ عددها 12 قرصًا مع 16 أونصة من الماء

- في صباح يوم تنظيف القولون (5 إلى 8 ساعات قبل تنظيف القولون، وليس قبل أقل من 4 ساعات من بدء تناول الجرعة الأولى)، افتح الزجاجة الثانية المحتوية على 12 قرصًا.
- كرر الخطوة من واحد إلى أربعة من اليوم الأول، الجرعة الأولى.



لا تظهر الأقراص بالحجم الفعلي.

هام: يجب عليك تناول كافة أقراص STAUB مع شرب الكميات المطلوبة من الماء قبل ساعتين على الأقل من إجراء تنظيف القولون.

(يرجى الاطلاع على الصفحة الأخرى لمزيد من الإرشادات الإضافية.)

ما الذي يجب عليك تناوله في اليوم السابق لتنظيف القولون

يُرجى اتباع نظام غذائي منخفض البقايا/الألياف وعدم تناول أي شيء بعد بدء تحضير الأمعاء. تناول الأطعمة المسموح بها ما لم يوجه طبيبك بخلاف ذلك.

ما يمكنك فعله

- يمكنك تناول وجبة إفطار منخفضة البقايا/الألياف فقط. تشمل الأطعمة منخفضة البقايا/الألياف البيض، والخبز الأبيض، والجبن القريش، والزبادي، وجريش الذرة، والقهوة، والشاي.
- يمكنك شرب السوائل الشفافة.

ما لا يمكنك فعله

- لا تشرب الحليب ولا تأكل أو تشرب أي شيء ملون بالأحمر أو البنفسجي.
- لا تشرب الكحول.
- لا تتناول مسهلات أخرى أثناء تناول أقراص SUTAB® (كبريتات الصوديوم، وكبريتات المغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم).
- لا تتناول أدوية عن طريق الفم في غضون ساعة قبل تناول كل جرعة من SUTAB.
- في حال أخذ مضاد حيوي من نوع تيتراسايكلين أو فلوروكينولون، أو تناول الحديد، أو الديجوكسين، أو الكلوربيرومازين، أو البيينيسيلاين، خذ تلك الأدوية قبل ساعتين على الأقل و ليس أقل من 6 ساعات بعد تناول كل جرعة من جرعتي SUTAB.

السوائل التي يمكن شربها

- القهوة أو الشاي (دون إضافة الحليب أو مبييض القهوة غير المصنع من الحليب)
- عصائر الفواكه (دون اللب)
- حلوى جيلاتينية (دون فواكه أو إضافات)
- الماء.
- حساء الدجاج.
- المشروبات الغازية الشفافة (مثل مشروب الزنجبيل)

لاحظ

- STAUB هو مسهل تناضحي مخصص لتنظيف القولون من أجل التحضير لإجراء تنظيف القولون عند البالغين.
- تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو دون وصفة طبية والقيتامينات والمكمّلات العشبية. قد يؤثر SUTAB على مفعول الأدوية الأخرى.
- قد لا يتم امتصاص الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم بشكل ملائم في حال تناولها خلال ساعة واحدة قبل بدء كل جرعة من SUTAB.
- أكثر الأعراض الجانبية شيوعاً بعد تناول STAUB الغثيان، وانتفاخ البطن، والقيء، والام في الجزء العلوي من البطن.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك إذا كنت تعاني من قيء شديد أو علامات الجفاف بعد تناول SUTAB أو إذا عانيت من عدم انتظام ضربات القلب أو نوبة تشنجية.
- إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول SUTAB، اتصل بطبيبك.

تعليمات خاصة من مُقدّم الرعاية الصحية

الإجراء

الوقت/التاريخ: _____

المكان: _____

إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى الاتصال بمُقدّم الرعاية الصحية المتابع لحالتك على:

يُرجى قراءة كامل المعلومات الخاصة بوصف الدواء ودليل المعالجة المُرفقين في العبوة.

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج، يُرجى الاتصال على الرقم 18008746756.

 BRAINTREE
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®

مُقدّمة كخدمة تعليمية من