

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____ Código postal: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

SUTAB®

(sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de potasio)
en comprimidos
1.479 g/0.225 g/0.188 g



Esquema de administración

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe beberse con agua, y debe beberse más agua luego de cada dosis.

DÍA 1, DOSIS 1

El día ANTERIOR a la colonoscopia

Le recomendamos que **se mantenga bien hidratado antes, durante y después** de tomar SUTAB.

Trague los 12 comprimidos con las primeras 16 onzas de agua

El día anterior a la colonoscopia, abra el primer frasco de 12 comprimidos y tome SUTAB como se describe a continuación.

PASO 1 Abra un frasco de 12 comprimidos.

PASO 2 Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado).

Trague un comprimido cada uno o dos minutos. Debe tomar los 12 comprimidos y las 16 onzas de agua en menos de 20 minutos.



IMPORTANTE: Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

Beba los 2 recipientes adicionales con 16 onzas de agua cada uno

PASO 3 Aproximadamente **una hora** después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

PASO 4 Aproximadamente **30 minutos** después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

DÍA 2, DOSIS 2

El día DE la colonoscopia

Trague los otros 12 comprimidos con otras 16 onzas de agua

- El día de la colonoscopia (de 5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de 4 horas después de iniciar la primera dosis), abra el segundo frasco de 12 comprimidos.
- Repita el PASO 1 al PASO 4 del DÍA 1, DOSIS 1.



IMPORTANTE: Debe tragar todos los comprimidos y beber toda el agua al menos 2 horas antes de la colonoscopia.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

