

DANE DOSTAWCY USŁUG MEDYCZNYCH

Nazwa: _____

Adres: _____

Miejscowość: _____

Stan: _____ Kod pocztowy: _____

Telefon: _____ Faks: _____

SUTAB[®]

(siarczan sodu, siarczan magnezu i chlorek potasu)
Tabletki

1,479 g / 0,225 g / 0,188 g



Dawkowanie

SUTAB podawany jest w dawkach podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Do pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są łącznie 24 tabletki. Tabletki będą przyjmowane w dwóch dawkach, z których każda składa się z 12 tabletek. Każdą dawkę SUTAB należy przyjmować popijając wodą oraz konieczne będzie wypicie dodatkowej ilości wody po przyjęciu każdej dawki.

DZIEŃ 1, DAWKA 1

W dzień **POPREDZAJĄCY** kolonoskopię

12 tabletek należy połknąć, popijając pierwszą objętością 16 uncji wody.

W dniu poprzedzającym kolonoskopię należy otworzyć pierwszą butelkę zawierającą 12 tabletek i przyjąć SUTAB zgodnie z poniższymi wskazówkami.

KROK 1 Otworzyć jedną butelkę zawierającą 12 tabletek.

KROK 2 Napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia). **Polykać 1 tabletkę co 1 do 2 minut. Przyjmowanie 12 tabletek i całej objętości 16 uncji wody należy zakończyć w ciągu 20 minut.**



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

WAŻNE: W przypadku wystąpienia objawów związanych z przygotowaniem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zmniejszyć tempo przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.

Wypić jeszcze dwie objętości po 16 uncji wody.

KROK 3 Po upływie około **1 godziny** od momentu połknięcia ostatniej tabletki należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.


KROK 4 Po upływie około **30 minut** od opróżnienia drugiego pojemnika należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

DZIEŃ 2, DAWKA 2

Dzień **WYKONANIA** kolonoskopii

Kolejną dawkę 12 tabletek należy połknąć, popijając drugą objętością 16 uncji wody.

- W dniu kolonoskopii (5 do 8 godzin przed kolonoskopią, lecz nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki 1) należy otworzyć drugą butelkę zawierającą 12 tabletek.
- Powtórzyć KROK 1 do KROKU 4 z DNIA 1, DAWKI 1.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

WAŻNE: Wszystkie tabletki należy połknąć oraz wypić całość wody co najmniej na 2 godziny przed kolonoskopią.

(Dodatkowe instrukcje podano na odwrocie strony.)

