

## INFORMAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

# SUTAB®

(sulfato de sódio, sulfato de magnésio e cloreto de potássio)

Comprimidos

1,479 g/0,225 g/0,188 g



### Esquema posológico

SUTAB deve ser administrado em um esquema de dose dividida (2 dias). No total, devem ser tomados 24 comprimidos para completar o preparo para a colonoscopia. Você deverá tomar os comprimidos em duas doses de 12 comprimidos cada. É necessário tomar cada dose de SUTAB com água e beber mais água depois de cada dose.

#### DIA 1, DOSE 1

No dia ANTERIOR à colonoscopia


Recomendamos que você se **hidrate adequadamente antes, durante e depois** de tomar SUTAB.

#### Engula os 12 comprimidos com os primeiros 500 mL de água

No dia anterior à colonoscopia, abra o primeiro frasco de 12 comprimidos e tome SUTAB conforme descrito abaixo.

**ETAPA 1** Abra 1 frasco de 12 comprimidos.

**ETAPA 2** Encha o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente). **Engula 1 comprimido a cada 1 a 2 minutos. Você deve tomar os 12 comprimidos e todos os 500 mL de água em 20 minutos.**



Os comprimidos não são mostrados em tamanho real.

**IMPORTANTE:** Caso você apresente sintomas relacionados ao preparo (como náusea, estufamento ou cólicas), faça uma pausa ou reduza o ritmo de consumo da água adicional até a diminuição dos sintomas.

#### Beba os dois 500 mL adicionais de água

**ETAPA 3** Cerca de **1 hora** após a ingestão do último comprimido, encha novamente o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente) e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

**ETAPA 4** Cerca de **30 minutos** após tomar o segundo recipiente com água, encha novamente o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente) e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

#### DIA 2, DOSE 2

No DIA da colonoscopia

#### Engula os outros 12 comprimidos com mais 500 mL de água

- No dia da colonoscopia (5 a 8 horas antes da colonoscopia e não menos de 4 horas após o início da Dose 1), abra o segundo frasco de 12 comprimidos.
- Repita as ETAPAS 1 a 4 do DIA 1, DOSE 1.



Os comprimidos não são mostrados em tamanho real.

**IMPORTANTE:** Você deve terminar de tomar todos os comprimidos de SUTAB e o volume indicado de água pelo menos 2 horas antes da colonoscopia.

(Consulte a outra página para instruções adicionais.)

