

## 医务人员信息

姓名: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

城市: \_\_\_\_\_

州: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_



## 给药方案

SUTAB 为分剂量 (2 天) 给药方案。为了完成结肠镜的检查准备, 共需要服用 24 片药片。您将分两次服药, 每次服用 12 片药片。每次服用 SUTAB 时必须饮水, 并且在服用每次剂量后都必须饮用额外的水。

### 第 1 天、第 1 剂 结肠镜检查前一天

我们建议您在服用 SUTAB 之前、期间和之后充分补充水分。

#### 用第一杯 16 盎司的水服用 12 片药物

结肠镜检查前一天, 打开第一瓶 12 片, 如下述方式服用 SUTAB。

**第 1 步** 打开一个含 12 片药片的药瓶。

**第 2 步** 在提供的容器中装满 16 盎司的水 (至填充线)。**每 1 至 2 分钟吞服 1 片药物。您应该在 20 分钟内服用 12 片药片以及全部 16 盎司的水。**



**重要事项:** 如果您发生与准备检查有关的症状 (如恶心、腹胀或抽筋), 请暂停饮用额外的水或减慢饮水速度, 直到症状减轻为止。

#### 再饮用两杯 16 盎司的水

**第 3 步** 服用最后一片药片约 1 小时后, 再次将提供的容器装满 16 盎司的水 (至填充线), 并在 30 分钟内饮用完毕。

**第 4 步** 在饮完第二个容器中的水后约 30 分钟, 将提供的容器装满 16 盎司的水 (至填充线), 并在 30 分钟内喝掉全部的水。

### 第 2 天、第 2 剂 结肠镜检查当天

#### 用另一杯 16 盎司的水服用 12 片药物

- 在结肠镜检查的当天 (结肠镜检查前 5 至 8 个小时并且在开始服用第 1 剂药物 4 小时后), 打开第二个含 12 片药片的药瓶。
- 重复第一天、第 1 剂药物的步骤 1 到步骤 4。



**重要事项:** 您必须在结肠镜检查前至少 2 小时服用所有的 SUTAB 药片并饮用所有的水。

## 结肠镜检查前一天进食的食物

请遵循低渣饮食进食方案, 开始肠道准备后请勿进食任何食物。除非医生另有医嘱, 否则仅进食允许的食物。

### 您可以做哪些事

- 您仅可食用低渣早餐。低渣食物包括鸡蛋、白面包、干酪、酸奶、粗玉米粉、咖啡和茶。
- 您可以饮用澄清液体。

### 您不可以做哪些事

- 切勿饮用牛奶, 切勿食用或饮用任何红色或紫色的食物或饮品。
- 切勿饮酒。
- 服用 SUTAB® (硫酸钠、硫酸镁和氯化钾) 药片时, 切勿应用其他泻药。
- 在每次开始服用 SUTAB 前的 1 小时内切勿服用口服药物。
- 如果服用四环素或氟喹诺酮类抗生素、铁、地高辛、氯丙嗪或青霉胺, 则应在每次服用 SUTAB 的至少 2 小时前和不少于 6 小时后服用上述药物。

### 可以饮用的液体

- 咖啡或茶 (不含奶油或非乳制奶精)
- 果汁 (不含果肉)
- 明胶甜点 (不含水果或打顶奶油)
- 水
- 鸡汤
- 澄清苏打水 (如姜汁汽水)

### 注释

- SUTAB 是一种渗透性泻药, 可用于清洁结肠, 为成人结肠镜检查做好准备。
- 请务必告知您的医生您所服用的所有药物, 包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。SUTAB 可能会影响其他药物的药效。
- 如果在开始服用每剂 SUTAB 前 1 小时内口服其他药物, 药物可能无法正常吸收。
- 服用 SUTAB 后最常见的不良反应是恶心、腹胀、呕吐和上腹痛。
- 如果服用 SUTAB 后出现明显的呕吐或脱水体征, 或者出现心律不齐或癫痫发作, 请与您的医务人员联系。
- 如果您对服用 SUTAB 有任何疑问, 请致电您的医生。

## 您的医务人员的特别说明

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 您的检查

时间/日期: \_\_\_\_\_

地点: \_\_\_\_\_

如有任何疑问, 请通过以下方式与您的医务人员联系:

请阅读药盒中的完整处方信息和药物指南。

欲了解有关此产品的更多信息, 请致电  
1-800-874-6756。

作为来自下列机构的教育服务而提供

