

SUTAB®

كبريتات الصوديوم وكبريتات المغنيسيوم
وكلوريد البوتاسيوم
أقرص
1.479 جم / 0.225 جم / 0.188 جم



نظام الجرعات

SUTAB هو جرعة مُقسّمة (على يومين). يلزم تناول ما مجموعه 24 قرصًا للتحضير التام لتنظيف القولون. ينبغي تناول الأقرص في جرعتين بمقدار 12 قرصًا في كل جرعة. يجب شرب الماء مع كل جرعة SUTAB، وشرب كمية إضافية من الماء بعد كل جرعة.

اليوم الأول، الجرعة الأولى—اليوم السابق لخضوعك لتنظيف القولون

ابتلع 12 قرصًا مع أول 16 أونصة من الماء

الخطوة الأولى افتح زجاجة واحدة محتوية على 12 قرصًا.

الخطوة الثانية املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية). **ابتلع قرصًا واحدًا كل دقيقة أو دقيقتين. يجب الانتهاء من تناول 12 قرصًا و 16 أونصة كاملة من الماء في غضون 20 دقيقة.**



لا تظهر الأقرص بالحجم الفعلي.

هام: إذا شعرت بأعراض لها علاقة بالتحضير (مثل، الغثيان، الانتفاخ، التشنج)، توقف أو تمهل في معدل شرب الكمية الإضافية من الماء حتى تتلاشى الأعراض.

اشرب 16 أونصة إضافية من الماء

الخطوة الثالثة بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص الأخير، املاً الحاوية المرفقة مرة أخرى بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، واشرب الكمية بأكملها على مدار 30 دقيقة.

الخطوة الرابعة بعد 30 دقيقة تقريبًا من الانتهاء من شرب محتوى حاوية الماء الثانية، املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، واشرب الكمية بأكملها على مدار 30 دقيقة.

اليوم الثاني، الجرعة الثانية—يوم خضوعك لتنظيف القولون

ابتلع الأقرص المتبقية التي يبلغ عددها 12 قرصًا مع 16 أونصة من الماء

• في صباح يوم تنظيف القولون (5 إلى 8 ساعات قبل تنظيف القولون ولكن ليس قبل أقل من 4 ساعات من بدء تناول الجرعة الأولى)، افتح الزجاجة الثانية المحتوية على 12 قرصًا. كرر الخطوة من واحد إلى أربعة من اليوم الأول، الجرعة الأولى.



لا تظهر الأقرص بالحجم الفعلي.

تنبيه مهم: يجب عليك تناول كافة أقرص STAUB مع شرب الكميات المطلوبة من الماء قبل ساعتين على الأقل من إجراء تنظيف القولون.

يرجى قراءة كامل المعلومات الخاصة بوصف الدواء ودليل المعالجة المرفقين في العبوة.

سُجري التنظير الدكتور:

العنوان:

تاريخ إجراء التنظير: موعده الوصول: صباحًا/مساءً

تعليقات:

ما الذي يجب عليك تناوله في اليوم السابق لتنظيف القولون

يُرجى اتباع نظام غذائي منخفض البقايا/الألياف وعدم تناول أي شيء بعد بدء تحضير الأمعاء. تناول الأطعمة المسموح بها ما لم يوجه طبيبك بخلاف ذلك.

ما يمكنك فعله

- يمكنك تناول وجبة إفطار منخفضة البقايا/الألياف فقط. تشمل الأطعمة منخفضة البقايا/الألياف البيض، والخبز الأبيض، والجبن القريش، والزبادي، وجريش الذرة، والقهوة، والشاي.
- يمكنك شرب السوائل الشفافة.

ما لا يمكنك فعله

- لا تشرب الحليب ولا تأكل أو تشرب أي شيء ملون بالأحمر أو البنفسجي.
- لا تشرب الكحول.
- لا تتناول مسهلات أخرى طوال استخدام أقرص SUTAB.
- لا تتناول أدوية عن طريق الفم في غضون ساعة قبل تناول كل جرعة من SUTAB.
- في حال أخذ مضاد حيوي من نوع تيتراسيكلين أو فلوروكينولون، أو تناول الحديد، أو الديجوكسين، أو الكلوربرومازين، أو الإينيسيلامين، خذ تلك الأدوية قبل ساعتين على الأقل وليس أقل من 6 ساعات بعد تناول كل جرعة من جرعتي SUTAB.

السوائل التي يمكن شربها

- القهوة أو الشاي (دون إضافة الحليب أو مبيّض القهوة غير المُصنّع من الحليب)
- عصائر الفواكه (دون اللب)
- الحلوى الجيلاتينية (دون فواكه أو إضافات)
- الماء.
- حساء الدجاج.
- المشروبات الغازية الشفافة (مثل مشروب الزنجبيل)

لاحظ

- STAUB هو مسهل تناضحي مخصص لتنظيف القولون من أجل التحضير لإجراء تنظيف القولون عند البالغين.
- تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تصرف بوصفة طبية أو دون وصفة طبية والفيتامينات والمُكمّلات العشبية. قد يؤثر SUTAB على مفعول الأدوية الأخرى.
- قد لا يتم امتصاص الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم بشكل ملائم في حال تناولها خلال ساعة واحدة قبل بدء كل جرعة من SUTAB.
- أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا بعد تناول STAUB الغثيان، وانتفاخ البطن، والقيء، وآلام في الجزء العلوي من البطن.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك إذا كنت تعاني من قيء شديد أو علامات الجفاف بعد تناول SUTAB أو إذا عانيت من عدم انتظام ضربات القلب أو نوبة تشنجية.
- إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول SUTAB، اتصل بطبيبك.

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج، اتصل على الرقم 18008746756.

Braintree
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS

©2022 Braintree Laboratories, Inc.

مُقدّمة كخدمة تعليمية من

201-123-313

يونيه 2022