

Su procedimiento estará a cargo del doctor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_\_ Llegue a las: \_\_\_\_\_ a. m./p. m.

Comentarios: \_\_\_\_\_

**SUTAB®**  
(sulfato de sodio, sulfato de  
magnesio y cloruro de potasio)  
en comprimidos  
1.479 g/0.225 g/0.188 g



### Alimentos permitidos el día ANTERIOR a la colonoscopia

Siga una dieta con pocos residuos y no coma nada después de empezar la preparación intestinal. Consuma los alimentos permitidos, a menos que su médico le recomiende algo diferente.

#### Lo que PUEDE hacer

- Puede consumir únicamente un desayuno con pocos residuos. Algunos desayunos con pocos residuos son huevos, pan blanco, queso cottage, yogur, sémola de maíz, café y té.
- Puede beber líquidos transparentes.

#### Lo que NO PUEDE hacer

- No beba leche, ni consuma nada de color rojo ni morado.
- No beba alcohol.
- No use otros laxantes mientras toma SUTAB.
- No tome medicamentos por vía oral en el lapso de una hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.
- Si está tomando antibióticos de las familias de la tetraciclina o fluoroquinolona, hierro, digoxina, clorpromazina o penicilamina, tome estos medicamentos al menos 2 horas antes y no antes de las 6 horas de la administración de cada dosis de SUTAB.

#### Líquidos que PUEDE beber

- Café o té (sin crema ni sustituto no lácteo de crema)
- Jugos de fruta (sin pulpa)
- Postres de gelatina (sin fruta ni cobertura)
- Agua
- Caldo de pollo
- Bebida gaseosa clara (como ginger ale)

#### Nota

- SUTAB es un laxante osmótico indicado para la limpieza del colon en preparación para la colonoscopia en adultos.
- Asegúrese de informar a su médico acerca de todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. SUTAB puede afectar la eficacia de otros medicamentos.
- Los medicamentos que se toman por vía oral pueden no absorberse adecuadamente cuando se ingieren menos de una hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.
- Las reacciones adversas más comunes tras la administración de SUTAB fueron náuseas, distensión abdominal, vómitos y dolor en la parte superior del abdomen.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta vómitos considerables o signos de deshidratación después de tomar SUTAB o si experimenta arritmias cardíacas o convulsiones.
- Si tiene preguntas acerca del uso de SUTAB, llame a su médico.

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756.

### Esquema de administración

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe beberse con agua, y debe beberse más agua luego de cada dosis.

#### DÍA 1, DOSIS 1: el día ANTERIOR a la colonoscopia

##### Trague los 12 comprimidos con las primeras 16 onzas de agua

**PASO 1** Abra un frasco de 12 comprimidos.

**PASO 2** Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). **Trague un comprimido cada uno o dos minutos. Debe tomar los 12 comprimidos y las 16 onzas de agua en menos de 20 minutos.**



Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.



**IMPORTANTE:** Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

##### Beba los 2 recipientes adicionales con 16 onzas de agua cada uno

**PASO 3** Aproximadamente **una hora** después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

**PASO 4** Aproximadamente **30 minutos** después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

#### DÍA 2, DOSIS 2: el día DE la colonoscopia

##### Trague los otros 12 comprimidos con otras 16 onzas de agua

- El día de la colonoscopia (de 5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de 4 horas después de iniciar la primera dosis), abra el segundo frasco de 12 comprimidos.
- Repita el PASO 1 al PASO 4 del DÍA 1, DOSIS 1.



Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.



**IMPORTANTE:** Debe tragar todos los comprimidos y beber toda el agua al menos 2 horas antes de la colonoscopia.

Lea la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento incluidas en el kit.

Se proporciona como un servicio educativo de

**BRAINTREE**  
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®

©2022 Brintree Laboratories, Inc.

201-123-3

Junio de 2022