

Lekarz wykonujący badanie: _____

Adres: _____

Data badania: _____ Godzina zgłoszenia się na badanie: _____

Uwagi: _____

SUTAB®

(siarczan sodu, siarczan magnezu i chlorek potasu)
Tabletki
1,479 g / 0,225 g / 0,188 g



Co można jeść w dzień POPRZEDZAJĄCY kolonoskopię

Należy stosować dietę ubogoresztkową i nie jeść niczego po rozpoczęciu przyjmowania preparatu do przygotowania jelit. Należy jeść produkty dozwolone, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Co JEST dozwolone

- Można zjeść śniadanie składające się tylko z ubogoresztkowych produktów żywnościowych. Ubogoresztkowe produkty żywnościowe na śniadanie obejmują jajka, biały chleb, twarożek, jogurt, płatki owsiane, kawę i herbatę.
- Można przyjmować klarowne płyny.

Co NIE JEST dozwolone

- Nie wolno pić mleka oraz jeść ani pić niczego o czerwonym lub purpurowym zabarwieniu.
- Nie wolno pić alkoholu.
- Podczas przyjmowania SUTAB nie wolno przyjmować innych środków przeczyszczających.
- Nie wolno przyjmować doustnych leków w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania każdej dawki SUTAB.
- W przypadku stosowania antybiotyków tetracyklinowych lub fluorochinolonowych, żelaza, digoksyny, chlorpromazyny lub penicylaminy należy je przyjmować na co najmniej 2 godziny przed przyjęciem i nie wcześniej niż po upływie co najmniej 6 godzin od przyjęcia każdej dawki SUTAB.

DOZWOLONE płyny

- Kawa lub herbata (bez śmietanki lub bezmlecznego zabielaacza)
- Soki owocowe (bez miąższu)
- Desery galaretkowe (bez owoców lub przybrania)
- Woda
- Bulion z kurczaka
- Klarowne napoje gazowane (np. gazowany napój z imbirem)

Uwaga

- SUTAB to osmotyczny środek przeczyszczający wskazany do oczyszczania jelita grubego u osób dorosłych w ramach przygotowania do kolonoskopii.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach, w tym wydawanych na receptę i bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych. SUTAB może wpływać na działanie innych leków.
- Leki przyjmowane doustnie mogą nie zostać prawidłowo wchłonięte, jeśli będą przyjęte w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania każdej dawki SUTAB.
- Najczęstsze działania niepożądane po podaniu SUTAB obejmowały nudności, wzdęcia, wymioty i ból w nadbrzuszu.
- W przypadku wystąpienia ciężkich wymiotów lub oznak odwodnienia po przyjęciu SUTAB, bądź w przypadku wystąpienia arytmii serca lub napadów drgawkowych należy skontaktować się z dostawcą usług medycznych.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SUTAB należy zadzwonić do swojego lekarza.

Informacje o tym produkcie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-874-6756.

Dawkowanie


SUTAB podawany jest w dawkach podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Do pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są łącznie 24 tabletki. Tabletki będą przyjmowane w dwóch dawkach, z których każda składa się z 12 tabletek. Każdą dawkę SUTAB należy przyjmować popijając wodą oraz konieczne będzie wypicie dodatkowej ilości wody po przyjęciu każdej dawki.

DZIEŃ 1, DAWKA 1—W dzień POPRZEDZAJĄCY kolonoskopię

12 tabletek należy połknąć, popijając pierwszą objętością 16 uncji wody.

KROK 1 Otworzyć jedną butelkę zawierającą 12 tabletek.

KROK 2 Napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia). **Polykać 1 tabletkę co 1 do 2 minut. Przyjmowanie 12 tabletek i całej objętości 16 uncji wody należy zakończyć w ciągu 20 minut.**



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

WAŻNE: W przypadku wystąpienia objawów związanych z przygotowaniem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zmniejszyć tempo przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.

Wypić jeszcze dwie objętości po 16 uncji wody.

KROK 3 Po upływie około **1 godziny** od momentu połknięcia ostatniej tabletki należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

KROK 4 Po upływie około **30 minut** od opróżnienia drugiego pojemnika należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

DZIEŃ 2, DAWKA 2—W dzień WYKONANIA kolonoskopii

Kolejną dawkę 12 tabletek należy połknąć, popijając drugą objętością 16 uncji wody.

- W dniu kolonoskopii (5 do 8 godzin przed kolonoskopią, lecz nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki 1) należy otworzyć drugą butelkę zawierającą 12 tabletek.
- Powtórzyć KROK 1 do KROKU 4 z DNIA 1, DAWKI 1.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

WAŻNE: Wszystkie tabletki należy połknąć oraz wypić całość wody co najmniej na 2 godziny przed kolonoskopią.

Należy zapoznać się z całością treści druków informacyjnych oraz instrukcji stosowania leku, które załączone do zestawu.

Dostarczone w ramach usług edukacyjnych przez

