

Thủ thuật của quý vị sẽ được thực hiện bởi Bác sĩ: _____

Địa chỉ: _____

Ngày làm thủ thuật: _____ Đến vào lúc: _____ Sáng/Chiều

Lưu ý: _____

SUTAB®
(sodium sulfate, magnesium sulfate, và potassium chloride)
Viên nén
1.479 g/0.225 g/0.188 g



Nên ăn những gì vào ngày TRƯỚC ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng

Hãy tuân theo chế độ ăn dễ tiêu và không ăn bất cứ thứ gì sau khi bắt đầu chuẩn bị ruột để nội soi đại tràng. Ăn những gì được cho phép trừ khi có chỉ dẫn khác của bác sĩ.

Những điều quý vị ĐƯỢC làm

- Quý vị chỉ được ăn sáng với những thức ăn dễ tiêu. Bữa sáng dễ tiêu gồm trứng, bánh mì trắng, phô mai cottage, sữa chua, grits (bắp nghiền), cà phê và trà.
- Quý vị có thể dùng chất lỏng trong suốt.

Những điều quý vị KHÔNG ĐƯỢC làm

- Không uống sữa hoặc ăn hoặc uống bất cứ thứ gì có màu đỏ hoặc màu tím.
- Không dùng thức uống có cồn.
- Không dùng các thuốc nhuận tràng khác trong khi dùng SUTAB.
- Không uống thuốc nào khác trong vòng 1 giờ trước khi bắt đầu dùng mỗi liều SUTAB.
- Nếu có dùng thuốc kháng sinh tetracycline hoặc fluoroquinolone, sắt, digoxin, chlorpromazine hoặc penicillamine, hãy dùng những thuốc này cách ít nhất là 2 giờ trước khi dùng mỗi liều SUTAB và cách không dưới 6 giờ sau khi dùng mỗi liều SUTAB này.

Chất lỏng ĐƯỢC uống

- Cà phê hoặc trà (không kem hoặc kem béo thực vật)
- Nước ép trái cây (không có bã)
- Các món tráng miệng có thạch gelatin (không trái cây hoặc topping)
- Nước lã
- Nước súp gà
- Soda màu trong (như nước ngọt có ga ginger ale)

Lưu ý

- SUTAB là thuốc nhuận tràng thẩm thấu được chỉ định để làm sạch đại tràng, chuẩn bị cho thủ thuật nội soi đại tràng ở người lớn.
- Hãy thông báo cho bác sĩ của quý vị biết tất cả các loại thuốc quý vị dùng, bao gồm cả thuốc theo toa và không theo toa, vitamin và chế phẩm bổ sung từ thảo dược. SUTAB có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc khác.
- Những thuốc quý vị cần uống có thể không hấp thu được đúng cách khi quý vị uống trong vòng 1 giờ đồng hồ trước khi bắt đầu dùng mỗi liều SUTAB.
- Những phản ứng bất lợi thường gặp nhất sau khi dùng SUTAB là buồn nôn, chướng bụng, nôn và đau bụng trên.
- Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị bị nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước sau khi dùng SUTAB, hoặc nếu quý vị bị loạn nhịp tim hoặc co giật.
- Nếu quý vị có thắc mắc gì về việc dùng SUTAB, vui lòng gọi cho bác sĩ của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này, vui lòng gọi số 1-800-874-6756.

Chế độ dùng thuốc

SUTAB là thuốc dùng theo chế độ phân liều (trong 2 ngày). Phải dùng tổng cộng 24 viên thuốc để chuẩn bị đầy đủ cho thủ thuật nội soi đại tràng. Quý vị sẽ chia số viên thuốc thành hai liều để uống, mỗi liều 12 viên. Uống mỗi liều SUTAB với nước, xong uống thêm nước sau mỗi liều.

NGÀY 1, LIỀU 1—Ngày TRƯỚC ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng

Nuốt 12 viên thuốc với 16 ounce nước đầu tiên

BƯỚC 1 Mở 1 lọ trong đó có 12 viên thuốc.

BƯỚC 2 Đổ đầy 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (rót đến vạch mức đồ đầy). **Nuốt 1 viên thuốc sau mỗi 1 đến 2 phút. Quý vị cần uống hết 12 viên thuốc và toàn bộ 16 ounce nước trong vòng 20 phút.**



Viên thuốc trong hình không đúng với kích thước thực tế.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu quý vị gặp những triệu chứng trong lúc dùng thuốc để chuẩn bị làm thủ tục nội soi này (như buồn nôn, đầy hơi hoặc đau bụng), hãy tạm dừng hoặc uống nước chậm lại cho đến khi những triệu chứng này giảm bớt.

Uống thêm hai ly nước 16 ounce

BƯỚC 3 Khoảng **1 giờ đồng hồ** sau khi uống viên thuốc cuối cùng, thêm 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (rót đến vạch mức đồ đầy) và uống hết ly nước này trong 30 phút.

BƯỚC 4 Khoảng **30 phút** sau khi uống xong ly nước thứ hai, rót 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (rót đến vạch mức đồ đầy) và uống hết ly nước này trong 30 phút.

NGÀY 2, LIỀU 2—Ngày TIẾN HÀNH thủ thuật nội soi đại tràng

Nuốt 12 viên thuốc khác với 16 ounce nước khác

- Vào ngày thực hiện nội soi đại tràng (từ 5 đến 8 giờ trước khi nội soi đại tràng và không sớm hơn 4 giờ kể từ khi bắt đầu dùng Liều 1), mở lọ thứ hai trong đó có 12 viên thuốc.
- Lặp lại BƯỚC 1 đến BƯỚC 4 giống như NGÀY 1, LIỀU 1.



Viên thuốc trong hình không đúng với kích thước thực tế.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Quý vị phải uống hết tất cả các viên thuốc và uống lượng nước cần thiết ít nhất 2 giờ đồng hồ trước khi bắt đầu thực hiện thủ thuật nội soi đại tràng.

Vui lòng đọc toàn phần Thông tin thuốc theo toa và hướng dẫn dùng thuốc trong bộ thuốc.

Được cung cấp dưới hình thức hướng dẫn qua

©2022 Braintree Laboratories, Inc.

201-123-v3 tháng 6 năm 2022

Braintree
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS