

## INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

# SUTAB®

(sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de potasio) en comprimidos  
1.479 g/0.225 g/0.188 g



Solo con fines ilustrativos.

### Esquema de administración

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe beberse con agua, y debe beberse más agua luego de cada dosis.

Le recomendamos que se mantenga bien hidratado antes, durante y después de tomar SUTAB.

### Día 1, dosis 1; en la noche anterior a la colonoscopia

#### Trague los 12 comprimidos con las primeras 16 onzas de agua

El día anterior a la colonoscopia, abra el primer frasco de 12 comprimidos y tome SUTAB como se describe a continuación.

**PASO 1** Abra un frasco de 12 comprimidos. **Retire y deseche el desecante.**

**Retire y deseche el desecante** del segundo frasco y cierre el frasco.

Use el segundo frasco para la segunda dosis en la mañana de la colonoscopia.



**PASO 2** Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado).

**Trague un comprimido cada uno o dos minutos. Debe tomar los 12 comprimidos y las 16 onzas de agua en menos de 20 minutos.**



Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.

**IMPORTANTE:** Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

#### Beba los 2 recipientes adicionales con 16 onzas de agua cada uno

**PASO 3** Aproximadamente **una hora** después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

**PASO 4** Aproximadamente **30 minutos** después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

**Día 2, dosis 2; en la mañana de la colonoscopia** (de 5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de 4 horas después de iniciar la dosis 1)

#### Trague los otros 12 comprimidos con otras 16 onzas de agua

- Continúe bebiendo solo líquidos claros hasta después de la colonoscopia.
- Repita los pasos 2 al 4 del día 1, dosis 1.
- Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.
- Tome todos los comprimidos de SUTAB y el agua al menos dos horas antes de la colonoscopia.



Los comprimidos no se muestran en el tamaño real.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

